アイモビーグを使用されている方へ

安心して続けるための

アイモビーグ自己注射 確認シート


監修 だいだいクリニック 院長 石井翔 ／ 看護部長 鈴木詩織



初めての方はもちろん、自己注射を継続されている方にも、
必ず確認していただきたい、特に大切なポイントを3つまとめました。
「最終チェック」にご活用ください。

ポイント1 方向をチェック！

- ☑ 紫色のスタートボタンが上
- ☑ 上下を逆に持たない
  正しい方向で持てば窓が見えます




⚠ **指に針を刺さないようにペンの方向を必ず確認**

⚠ **窓を見ながら注射**

ポイント2 全部黄色になるまで離さない！


終了時に「カチッ」という音が聞こえない時もあります

- ☑ 薬液確認窓が全部黄色に変わるまで皮膚に押し続ける



ポイント3 冷凍ではなく冷蔵！家族とも情報共有！

- ☑ 家に着いたらすぐ冷蔵庫に入れる
- ☑ 家族が間違えないよう、伝えておく
  ご家族が間違えて冷凍、廃棄、使用してしまった事例があります



⚠ **冷凍しない**
凍結した場合は使用しない


⚠ **2～8℃で保管**
・ワインセラー不可
・常温なら7日以内に使用

AMGEN 片頭痛コントロール

ご不明な点や気になることがありましたら、主治医にご相談いただくか、裏面に記載のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

アイモビーグの特長


アイモビーグは、4週間ごとに1本投与する皮下注射のお薬です



投与後の患者さんの状態に応じて、いつでも中止・再開ができます。
再開した場合も、投与量は初回と同じ1本です。

安全に、かつ簡単に操作できるように設計されたペン型注入器です


90%以上の患者さんがアイモビーグを使いやすくシンプルなデバイスと評価しています[1)]



1)Mead J et al. Patient Prefer Adherence. 2020; 14: 1137-1144.

操作は簡単、スタートボタンを押すだけ!

押して、待つだけで投与完了!
安全カバーを皮膚に最後まで
押しこまないとスタートボタンは
押せない仕組みで、
打ち損じやケガを防ぎます。




身体の中で「異物」として認識されにくいお薬です

アイモビーグはヒトの成分のみで作られた完全ヒト抗体のお薬です。
そのため免疫原性が低く、免疫システムの攻撃によるアレルギー反応を引き起こしづらいと考えられています[2, 3)]。

免疫原性ってなに?

抗体薬は、患者さんの身体の中で異物(抗原)として認識されて、体内の免疫システムに攻撃されてしまう場合があります。このときの攻撃のされやすさを、そのお薬の「免疫原性」といいます[4)]。
ヒト抗体により近い抗体、つまり免疫原性の低い抗体を作る技術の開発が進み、現在では100%ヒト由来の「完全ヒト抗体」をお薬として活用することができるようになりました。



2) Foltz IN et al. Circulation 2013; 127: 2222-2230.
3) Carter PJ and Quarmby V. Nat Rev Drug Discov 2024; 23: 898-913.
4) くすりの適正使用協議会:これだけは知っておきたいバイオ医薬品, 2024

お問い合わせ先
(患者さん、一般の方向け)
メディカルインフォメーションセンター
電話番号:0120-952-206
受付時間:平日9時～17時30分(土日・祝日・会社休日を除く)
アムジェン株式会社

ERN260014RM1
2026年7月作成